

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

[illegible]

Таблиця відвідувань

Будь ласка, використовуйте цю таблицю для запису дат відвідувань Вашого лікаря:

[illegible]

Просимо повідомляти про будь-які побічні реакції, у тому числі про випадки впливу лікарського засобу Роаккутан® на плід під час вагітності (незалежно від результату) за електронною адресою pvg@deltaswiss.eu або за телефонами +38(044) 593 33 55 (цьогодобовий телефон); +38(044) 593 38 86 (факс), або звернувшись до офісу компанії: Представництво "Дельта Медікал Промоушнз АГ", вул. Чорновола 43, м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна

Дані матеріали є навчальними та не розповсюджуються з метою реклами

Роаккутан®
Ізотретиноїн

Роаккутан® не можна застосовувати під час вагітності.

Якщо вагітна жінка приймає Роаккутан®, він може завдати серйозної шкоди ненародженій дитині.

Якщо Ви завагітніли або вважаєте, що можете бути вагітною, негайно припиніть прийом лікарського засобу Роаккутан® та зверніться до Вашого лікаря.

Уважно прочитайте інструкцію для медичного застосування перед початком лікування (також можливо ознайомитись за посиланням <http://www.drlz.com.ua>).

Якщо у Вас є будь-які питання або сумніви щодо прийому лікарського засобу Роаккутан®, зверніться до Вашого лікаря.

Що Вам необхідно робити, щоб уникнути вагітності:

- ! Вам необхідно використовувати щонайменше 1 високоефективний метод контрацепції (такий як внутрішньоматковий контрацептив (ВМК) або імплантат) або правильно використовувати 2 ефективних протизаплідних методи, які діють різними способами (наприклад оральний контрацептив разом з презервативом), до, під час та протягом 1 місяця після припинення лікування.

- ! **Вам не можна вагітніти під час прийому лікарського засобу Роаккутан® і протягом 1 місяця після припинення лікування.**

- ! **Вам необхідно регулярно відвідувати лікаря та регулярно проводити тест на вагітність:**

- Перед початком лікування Вам необхідно провести тест на вагітність, який повинен бути негативним.
- Для того, щоб переконатися, що Ви не вагітні під час лікування, Вам слід регулярно проводити тести на вагітність, щонайменше, раз на тиждень. Вам слід також провести заключний тест на вагітність через 1 місяць після припинення терапії.

Пам'ятка для чоловіків та жінок

Цей лікарський засіб

призначений саме для Вас.

Не передавайте його іншим особам, це може завдати їм шкоди.

Картка-пам'ятка для пацієнта

ПІБ лікаря:

Номер телефону:

Примітки: