

Roaccutane[®] (izotretinoinas)

Paciento priminimo apie Roaccutane[®] kortelė

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais būdais:

- tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv/PATIENT_PUBLIC

- užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama

<https://vvkt.lrv.lt/lt>

ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt);

- nemokamu telefonu 0 800 73 568.

Be to, šią informaciją galima pranešti UAB „Centralpharma Communications“ telefonu +37052430444, el. paštu pvlithuania@centralpharma.lt, ar paštu, adresu UAB „Centralpharma Communications“, J. Savickio g. 4-1, LT-01108 Vilnius, Lietuva

GYDYTOJO VARDAS, PAVARDĖ:

TELEFONO NR.:

PASTABOS:

Apsilankymų lentelė

Norėdami užsirašyti apsilankymų pas savo gydytoją datas, naudokitės šia lentele

Apsilankymo data	Naudojama kontracepcija	Nėštumo testo rezultatas	Gydytojo parašas
		☐ Teigiamas ☐ Neigiamas DATA:	
		☐ Teigiamas ☐ Neigiamas DATA:	
		☐ Teigiamas ☐ Neigiamas DATA:	
		☐ Teigiamas ☐ Neigiamas DATA:	
		☐ Teigiamas ☐ Neigiamas DATA:	
		☐ Teigiamas ☐ Neigiamas DATA:	
		☐ Teigiamas ☐ Neigiamas DATA:	
		☐ Teigiamas ☐ Neigiamas DATA:	

Paciento priminimo apie Roaccutane® kortelė

Nėštumo metu Roaccutane® vartoti draudžiama.

Jeigu nėščia moteris vartoja Roaccutane®, tai gali rimtai pakenkti negimusiam kūdikiui.

Jeigu pastojote arba manote, kad galite būti nėščia, tuoj pat nustokite vartojusi Roaccutane® ir kreipkitės į savo gydytoją.

Prieš pradėdama gydytis atidžiai perskaitykite pakuotės lapelį.

Jeigu turite kokių nors klausimų ar rūpesčių dėl Roaccutane® vartojimo, pasikalbėkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Ką turite daryti, jeigu galite pastoti:



Prieš pradedant gydymą, gydymo metu ir dar vieną mėnesį baigus gydymą Jūs turėsite naudotis bent vienu labai veiksmingu kontracepcijos metodu (pvz., vartojimo į gimdą sistema ar implantu) arba teisingai naudotis dviem veiksmingais nėštumo kontrolės metodais, veikiančiais skirtingais būdais (pvz., geriamasis kontraceptikas kartu su prezervatyvu).



Jums negalima pastoti vartojant Roaccutane® ir dar vieną mėnesį po gydymo pabaigos.



Jūs privalote reguliariai lankytis pas gydytoją ir atlikti nėštumo testus:

- ❖ Prieš pradedant gydymą Jūs turėsite atlikti nėštumo testą, kuris privalo būti neigiamas.
- ❖ Norėdama įsitikinti, kad nesate nėščia, gydymo metu turėsite reguliariai atlikti nėštumo testus, idealiau atveju kas mėnesį. Be to, Jūs turėsite paskutinį nėštumo testą atlikti praėjus vienam mėnesiui po gydymo pabaigos.

Priminimas vyrams ir moterims

Šis vaistas yra paskirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima, o nesuvalgomos kapsulės grąžinkite į vaistinę