



SVARĪGA INFORMĀCIJA PACIENTAM PAR ZĀĻU RISKU MAZINĀŠANU

Neotigason®, Roaccutane® un Isotretinoin Sandoz Grūtniecības nepieļaušanas programma Pacienta kartīte

Atgādinājums pacientei

Ārsta vārds:

Tālrunis:

Neotigason®, Roaccutane® un Isotretinoin Sandoz nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Ja grūtniece lieto Neotigason®, Roaccutane® vai Isotretinoin Sandoz, tas viņas nedzimušajam bērnam var radīt nopietnu kaitējumu.

Ja Jums iestājas grūtniecība, vai domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, nekavējoties pārtrauciet Neotigason®, Roaccutane® vai Isotretinoin Sandoz lietošanu un sazinieties ar savu ārstu.

Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai bažas par Neotigason®, Roaccutane® vai Isotretinoin Sandoz lietošanu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Aicinājums ziņot par novērotām zāļu blakusparādībām

Elektroniski vai pa pastu ZVA: www.zva.gov.lv; Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003

vai

par Neotigason - UAB Teva Baltics filiāle Latvijā pa tālruni 67323666 vai e-pastu

tevalatvia@teva.lv

par Roaccutane blaknēm lūgums ziņot pa tālruni +371 28309860; +371 6 7450497, e-pastu:

pvalatvia@centralpharma.lv

par Isotretinoin Sandoz blaknēm Lūgums ziņot Sandoz d.d. Latvia filiāle rakstot uz e-pasta adresi

adverse.event.latvia@sandoz.com

Ko darīt, ja Jums ir iespējama grūtniecība

- **Pirms ārstēšanās, tās laikā un vismaz trīs gadus pēc Neotigason® vai vienu mēnesi pēc Roaccutane® vai Isotretinoin Sandoz terapijas beigām Jums jālieto vismaz viena ļoti efektīva kontracepcijas metode (piemēram, dzemdē ievadāma ierīce vai implants) vai, pareizi jālieto, divas efektīvas atšķirīgas iedarbības kontracepcijas metodes (piemēram, iekšķīgi lietojams kontracepcijas līdzeklis un prezervatīvs).**
- **Jums nedrīkst iestāties grūtniecība minēto zāļu lietošanas laikā vai 3 gadus pēc Neotigason® vai 1 mēnesi pēc Roaccutane® vai Isotretinoin Sandoz lietošanas pārtraukšanas.**
- **Jums regulāri un atkārtoti jāapmeklē ārsts un jāveic regulāri grūtniecības testi:**
 - pirms ārstēšanas uzsākšanas Jums jāveic grūtniecības tests, kura rezultātam jābūt negatīvam;
 - lai pārliecinātos, ka ārstēšanas laikā Jums nav iestājusies grūtniecība, Jums jāveic regulāri grūtniecības testi – vislabāk reizi mēnesī. Jums jāveic grūtniecības testi arī reizi 1–3 mēnešos trīs gadus pēc zāļu Neotigason® un 1 mēnesi pēc zāļu Roaccutane® vai Isotretinoin Sandoz lietošanas pārtraukšanas.

Atgādinājums vīriešiem un sievietēm

Šīs zāles ir parakstītas tikai un vienīgi Jums, **nedodiet tās citiem cilvēkiem un neizlietotās kapsulas nododiet atpakaļ aptiekā.**

Apmeklējumu tabula

Lūdzu, reģistrējiet šajā tabulā savus ārsta apmeklējuma datus.

Ārsta vārds: _____

Tālrunis: _____

Apmeklējuma datums:	Izmantotā kontracepcija	Grūtniecības testu rezultāti:
		☐ Pozitīvs ☐ Negatīvs Datums:
		☐ Pozitīvs ☐ Negatīvs Datums:
		☐ Pozitīvs ☐ Negatīvs Datums:
		☐ Pozitīvs ☐ Negatīvs Datums:
		☐ Pozitīvs ☐ Negatīvs Datums:
		☐ Pozitīvs ☐ Negatīvs Datums:
		☐ Pozitīvs ☐ Negatīvs Datums:

Ziņošana par nevēlamām blakusparādībām

Jūs varat ziņot par blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai interneta vietnē www.zva.gov.lv vai skenējot zemāk attēloto QR kodu.



Pilnu informāciju par Neotigason®, Roaccutane®, Isotretinoin Sandoz lūdzam skatīt atbilstošā zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā.

Lietošanas instrukciju aktuālās versijas atrodamas www.zva.gov.lv

Roaccutane EDM-ROACC- RMPv2-Jan2024; Neotigason: RMPv6 13-12-2023;
Isotretinoin Sandoz RMP v.2.0.
Materiāls pēdējo reizi pārskatīts 2025. gada jūlijā.