

Tabella delle visite

Usi questa tabella per registrare i suoi appuntamenti con il medico.

Nome del medico:
.....
.....
.....
.....
.....

Telefono:
.....
.....
.....

Appunti:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data della visita	Contraccettivo impiegato	Risultato del test di gravidanza	Firma del medico
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Data:	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Data:	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Data:	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Data:	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Data:	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Data:	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Data:	
		<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo Data:	



Materiale informativo richiesto dall'autorità competente



Tessera del paziente per Roaccutan® (Isotretinoina)

05/2026

Questa scheda e l'informazione destinata ai pazienti contengono importanti informazioni di sicurezza sul trattamento con Roaccutan. È importante familiarizzare con i contenuti di entrambi i documenti prima di iniziare il trattamento. Porti sempre con sé questa scheda e la mostri a tutti i medici.

Avvertenze per uomini e donne

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di iniziare il trattamento. In caso di domande o dubbi sull'assunzione di Roaccutan, si rivolga al suo medico o al suo farmacista.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente. In nessuna circostanza deve essere consegnato ad altre persone e tutte le capsule non assunte devono essere riportate in farmacia.

Durante la terapia con Roaccutan e nel mese successivo alla sua interruzione occorre evitare di donare sangue a causa del potenziale rischio per il feto qualora la paziente che riceve la trasfusione sia incinta.

Avvertenze particolari per le donne

Roaccutan non deve essere assunto durante la gravidanza e il periodo dell'allattamento, poiché il principio attivo può passare nel latte materno.

Se assunto durante una gravidanza, Roaccutan può provocare gravi danni per il feto.

Se desidera intraprendere una gravidanza o sospetta di essere incinta, interrompa immediatamente l'assunzione di Roaccutan e si rivolga al suo medico.

Cosa fare se sussiste la possibilità di sviluppare una gravidanza

- ❗ Prima del trattamento, durante il trattamento e nel mese successivo alla fine del trattamento, lei deve usare almeno 1 metodo contraccettivo altamente efficace (per es. spirale o impianto) oppure 2 metodi contraccettivi efficaci che agiscono in modi diversi (per es. un contraccettivo orale con un preservativo). Durante l'assunzione di Roaccutan e nel mese successivo alla fine del trattamento lei non deve intraprendere una gravidanza.

- ❗ Lei deve presentarsi alle visite di controllo regolari e sottoporsi a test di gravidanza periodici.
 - Prima di iniziare il trattamento lei deve eseguire un test di gravidanza sotto supervisione medica e il risultato deve essere negativo.
 - Per escludere con certezza una gravidanza durante il trattamento, lei deve sottoporsi periodicamente (ogni mese) a test di gravidanza, effettuando un ultimo test anche 5 settimane dopo la fine del trattamento.

Per ulteriori informazioni leggere il foglietto illustrativo (www.swissmedicininfo.ch).

ISTRUZIONI per la segnalazione di effetti collaterali

Se nota qualche effetto collaterale, contatti direttamente il Suo medico, il personale medico o il Suo farmacista. Ciò vale per gli effetti collaterali non indicati nel presente opuscolo e nell'informazione destinata ai pazienti. Attraverso la segnalazione di effetti collaterali può contribuire a migliorare le conoscenze sulla tollerabilità e sull'impiego dei medicinali. Può segnalare eventuali effetti collaterali anche attraverso il medinfo@cheplapharm.ch.

Tessera del paziente

Nome del paziente:

.....
.....
.....
.....

Telefono:

.....
.....

Appunti:

.....
.....
.....