

MEELDETULETUS

kõikidele patsientidele

See ravim on välja kirjutatud üksnes Teile.

Ärge andke seda kellelegi teisele ning tagastage kõik kasutamata kapslid apteeki.

Te ei tohi doonorina verd loovutada isotretinoiiniravi ajal ja ühe kuu jooksul pärast ravi lõppu võimaliku ohu tõttu lootele, kui vereülekannde saab rase naine.

Kui Teil on mis tahes küsimusi või muresid seoses isotretinoiini võtmisega, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne ravi alustamist lugege hoolikalt pakendi infolehte.

PATSIENDI HOIATUSKAART

Arsti nimi:

.....

.....

.....

.....

Telefon:

.....

.....

PATSIENDI HOIATUSKAART

ISOTRETINOIIN

Rasestumisvõimeline naine või suguküps tütarlaps:

Olen teadlik, et

- isotretinoiini ei tohi võtta raseduse ajal. Isotretinoiin võib rasedusaegsel kasutamisel tõsiselt kahjustada veel sündimata last.
- kui rasestun või arvan end olevat rase, lõpetan otsekohe isotretinoiini kasutamise ja võtan ühendust oma arstiga.
- pean kasutama vähemalt ühte väga tõhusat rasestumisvastast meetodit (näiteks emakasisest vahendit või implantaati) või kasutama õigesti kahte tõhusat erineva toimeviisiga rasestumisvastast meetodit (näiteks suukaudseid rasestumisvastaseid tablette koos kondoomiga) enne ravi, ravi ajal ja vähemalt 1 kuu jooksul pärast ravi lõppu.
- ei tohi rasestuda isotretinoiiniravi ajal ega 1 kuu jooksul pärast ravi lõppu.

- pean käima regulaarselt kontrollvisiitidel ja tegema arsti juures rasedustesti (vereproovist).
- enne ravi alustamist pean tegema arsti juures rasedustesti, mis peab andma negatiivse vastuse.
- veendumaks, et ma ei ole ravi ajal rase, pean arsti juures tegema regulaarselt rasedustesti, ideaaljuhul kord kuus. Viimase rasedustesti pean tegema 1 kuu pärast ravi lõppu.

Mida peate tegema, kui olete rasestumisvõimeline naine või suguküps tütarlaps:

- ! Te peate kasutama vähemalt ühte väga tõhusat rasestumisvastast meetodit (näiteks emakasisest vahendit või implantaati) või kasutama õigesti kahte tõhusat erineva toimeviisiga rasestumisvastast meetodit (näiteks suukaudseid rasestumisvastaseid tablette koos

kondoomiga) enne ravi, ravi ajal ja vähemalt 1 kuu jooksul pärast ravi lõppu.

- ! **Te ei tohi rasestuda** isotretinoiiniravi ajal ega 1 kuu jooksul pärast ravi lõppu.

- ! **Te peate käima regulaarselt kontrollvisiitidel ja tegema rasedustesti (vereproovi):**

- Enne ravi alustamist peate tegema rasedustesti, mis peab andma negatiivse vastuse.
- Veendumaks, et Te ei ole ravi ajal rase, peate tegema regulaarselt rasedustesti, ideaaljuhul kord kuus. Te peate tegema ka viimase rasedustesti 1 kuu pärast ravi lõppu.