

Име на лекаря:

Телефон:

Бележки:

© 2026 | Версия 1

Референтен номер:
BG_001_EduMat_2026_04_V1

Одобрение от ИАП:

ИАП-16611/17.04.2026

График на посещенията

Моля, използвайте тази таблица, за да отбелязвате датите на посещенията при Вашия лекар:

Дата на посещение	Използвана контрацепция	Резултати от тест за бременност	Подпис на лекаря
		☐ Положителен ☐ Отрицателен Дата:	
		☐ Положителен ☐ Отрицателен Дата:	
		☐ Положителен ☐ Отрицателен Дата:	
		☐ Положителен ☐ Отрицателен Дата:	
		☐ Положителен ☐ Отрицателен Дата:	
		☐ Положителен ☐ Отрицателен Дата:	
		☐ Положителен ☐ Отрицателен Дата:	
		☐ Положителен ☐ Отрицателен Дата:	
		☐ Положителен ☐ Отрицателен Дата:	



Карта на пациента за
Roaccutane®

Roaccutane®

Изотретиноин

Roaccutane® не трябва да се приема по време на бременност.

Roaccutane® може сериозно да увреди плода, ако се приема от бременна жена.

Ако забременеете или мислите, че е възможно да сте бременна, незабавно спрете приема на Roaccutane® и се свържете с Вашия лекар.

Прочетете внимателно листовката, преди да започнете лечение.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно приема на Roaccutane®, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Бихме искали да напомним, че пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303, гр. София
Р. България
тел.: + 359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
е-mail: bda@bda.bg



www.bda.bg/ Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Какво трябва да правите, ако е възможно да забременеете:

- Вие трябва да използвате поне 1 високо ефективен метод на контрацепция (като вътрематочно изделие или имплант) или правилно да използвате 2 ефективни метода за предпазване от забременяване, които действат по различен начин (напр. перорален контрацептив заедно с презерватив) преди, по време на и в продължение на 1 месец след спиране на лечението.

- Вие не трябва да забременявате, докато приемате Roaccutane® или в продължение на 1 месец след спиране на лечението.
- Вие трябва редовно да се явявате на контролните прегледи и редовно да правите тестове за бременност:
 - Преди да започнете лечение, Вие трябва да направите тест за бременност, който трябва да бъде отрицателен.
 - За да се уверите, че не сте бременна по време на лечението, трябва редовно да правите тестове за бременност, в идеалния случай всеки месец. Също така трябва да направите последен тест за бременност 1 месец след края на лечението.

Напомняне за мъже и жени

Това лекарство е предписано лично на Вас, **не го преотстъпвайте на други хора и върнете всички неизползвани капсули обратно в аптеката.**

Карта на пациента

Име на лекаря:

Телефон:

Бележки: