

НАПОМИНАНИЕ для всех пациентов

Это лекарство выписано только для Вас.

Не давайте его кому-либо еще и возвращайте все неиспользованные капсулы в аптеку.

Вам нельзя сдавать кровь в качестве донора во время лечения изотретиноином и в течение одного месяца после его окончания из-за возможного риска для плода, если кровь получит беременная женщина.

Если у Вас есть какие-либо вопросы или беспокойства относительно приема изотретиноина, поговорите со своим врачом или фармацевтом.

Перед началом лечения внимательно прочитайте информационный лист упаковки.

КАРТА ОПОВЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА

Имя врача:

.....

.....

.....

.....

Телефон:

.....

.....

КАРТА ОПОВЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА

ИЗОТРЕТИНОИН

EE_017_EduMat_2025_10_V1

Способная к зачатию женщина или половозрелая девушка:

Я знаю, что

- изотретиноин нельзя принимать во время беременности.

Прием изотретиноина во время беременности может нанести серьезный вред еще нерожденному ребенку.

- если я забеременею или буду подозревать беременность, немедленно прекращу использование изотретиноина и обращусь к своему врачу.

- Я должна использовать по крайней мере один очень эффективный метод контрацепции (например, внутриматочное устройство или имплантат), или правильно использовать два эффективных метода контрацепции с разным механизмом действия (например, пероральные противозачаточные таблетки вместе с презервативом), перед лечением, во время лечения и в течение, как минимум, 1 месяца после окончания лечения.

- мне нельзя беременеть во время лечения изотретиноином и в течение 1 месяца после окончания лечения

- я должна регулярно ходить на контрольные визиты и делать тесты на беременность у врача (из образца крови)

- перед началом лечения я должна сделать тест на беременность у врача, который должен дать отрицательный результат.

- чтобы убедиться, что я не беременна во время лечения, я должна регулярно делать тесты на беременность, в идеальном случае - раз в месяц. Я также должна сделать последний тест на беременность через 1 месяц после окончания лечения.

Что Вам нужно делать, если Вы способная к зачатию женщина или половозрелая девушка

! Вы должны использовать по крайней мере один очень эффективный метод контрацепции (например, внутриматочное устройство или имплантат), или правильно использовать два эффективных метода контрацепции с разным механизмом действия (например, пероральные противозачаточные таблетки вместе

с презервативом), перед лечением, во время лечения и в течение, как минимум, 1 месяца после окончания лечения.

! Вы не должны забеременеть в период лечения изотретиноином или в течение 1 месяца после прекращения лечения.

! Вам нужно регулярно ходить на контрольные визиты и делать тесты на беременность (из образца крови):

- Перед началом лечения Вы должны сделать тест на беременность, который должен дать отрицательный результат.

- Чтобы убедиться, что Вы не беременны во время лечения, Вам нужно регулярно делать тесты на беременность, в идеальном случае - раз в месяц. Вы также должны сделать последний тест на беременность через 1 месяц после окончания лечения.